



Rapport sur la noyade au Canada

Édition de 2016

Élaboré par le Centre canadien de recherche
sur la prévention de la noyade pour la Société de sauvetage



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique


Nombre de décès évitables liés à l'eau au Canada de 1990 à 2013



Les plus récentes données disponibles en provenance des bureaux de coroners en chef et des médecins légistes font état que les progrès évidents et considérables à long terme en ce qui a trait à la diminution du nombre de décès par noyade au Canada se poursuivent. Suite à une hausse du nombre de noyades liées à l'eau en 2012 (495), ce chiffre a chuté à 466 en 2013. Une moyenne de 473 personnes se sont noyées à chaque année au cours de la plus récente période de cinq ans (de 2009 à 2013), ce qui constitue une diminution par rapport à la moyenne de 481 entre 2004 à 2008.

La moyenne de décès liés à l'eau a progressivement diminué au cours des 20 dernières années allant d'une moyenne de 2,0 par 100 000 habitants à chaque année au milieu des années 1990 (de 1994 à 1998) à une moyenne annuelle de 1,4 par 100 000 habitants selon les plus récentes données (de 2009 à 2013). Malgré ce progrès à long terme un nombre trop élevé de décès évitables liés à l'eau se produisent toujours au Canada à chaque année. Entre 2009 et 2013 un total de 2 364 enfants, jeunes et adultes ont perdu la vie dans les eaux canadiennes.

Variation du nombre de décès évitables liés à l'eau et du taux de mortalité au Canada, 1994–2013



Nombre de décès évitables liés à l'eau au Canada en 2014 et 2015

Les données provisoires et préliminaires concernant les décès par noyade recensés en 2014 et 2015 proviennent de rapport parus dans les médias et sur Internet. Tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous au moins 308 noyades ont été signalées en 2014 et au moins 313 autres en 2015.


Décès évitables liés à l'eau par province et territoire en 2014 et 2015

| Province / Territoire | 2014 | 2015 |
|---------------------------|------------|------------|
| Alberta | 28 | 15 |
| Colombie-Britannique | 62 | 67 |
| Manitoba | 15 | 9 |
| Nouveau-Brunswick | 6 | 7 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 14 | 18 |
| Nouvelle-Écosse | 12 | 19 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 | 2 |
| Nunavut | 7 | 5 |
| Ontario | 86 | 92 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 | 0 |
| Québec | 52 | 63 |
| Saskatchewan | 22 | 14 |
| Yukon | 2 | 2 |
| Total | 308 | 313 |

QUELLES SONT LES PERSONNES QUI SE NOIENT?

Groupes d'âge

Nombre de décès évitables liés à l'eau et taux de noyade par groupes d'âge au Canada de 2009 à 2013



Groupe d'âge

Les groupes d'âge les plus à risque parmi lesquels un plus grand nombre de noyades se produisent au Canada n'ont pas changé au cours des dix dernières années. Les taux de mortalité les plus élevés au cours de cette période se retrouvent à nouveau parmi les jeunes adultes âgés entre 20 et 34 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus (1,6 et 1,8 par 100 000 habitants respectivement). Au sein de ces groupes d'âge, les plus hauts taux de mortalité ont été enregistrés chez les jeunes de 20 à 24 ans et les aînés de 84 à 89 ans (1,9 et 2,0 par 100 000 habitants). De plus, dans toutes ces tranches d'âge, le plus grand nombre de décès par noyade ont été déplorés parmi les jeunes âgés de 20 à 24 ans avec une moyenne annuelle de 44 noyades. On a également enregistré des taux élevés chez les baby-boomers âgés entre 50 et 64 ans (1,5 par 100 000) et les adultes d'âge mur de 35 à 49 ans (1,3 par 100 000). Il est toutefois encourageant de constater que ces deux taux ont connu une légère diminution par rapport à ceux analysés lors de la dernière période de cinq ans (soit 1,6 et 1,4 respectivement).

Il est encourageant de constater que le taux le plus bas de noyade se recense chez les jeunes enfants. Le taux le moins élevé de décès liés à l'eau parmi tous les groupes d'âge se retrouve chez les jeunes âgés entre 5 et 14 ans (0,4 par 100 000) et le prochain

taux le plus bas se retrouve chez les enfants de moins de 5 ans (1,1 par 100 000). En effet, une tendance à long terme vers une baisse des taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au Canada semble se confirmer. Cette tendance s'est maintenue entre 2009 et 2013 puisque le taux de décès dans ce groupe d'âge a connu une baisse de 8 % par rapport à 1,2 de 2004 à 2008. Les efforts d'éducation en matière de prévention de la noyade auprès des parents de jeunes enfants semblent par conséquent porter leurs fruits.

Sexe

Encore une fois, la grande majorité des victimes de la noyade continuent d'être des hommes. Entre 2009 et 2013 une moyenne de 385 hommes se sont noyés à chaque année; ce qui se traduit par un taux de décès liés à l'eau de 2,3 par 100 000 habitants. Comparativement à une moyenne de 88 victimes de la noyade de sexe féminin soit 0,5 par 100 000 habitants.

Cette propension vers un plus grand nombre d'hommes était évidente dans les toutes les provinces et territoires, mais particulièrement dans les provinces de l'Est. Dans les Maritimes 9 de 10 victimes de la noyade étaient de sexe masculin. La prépondérance des victimes de sexe masculin est manifeste dans tous les groupes d'âge, en particulier chez les jeunes adultes de 20 à 34 ans. La proportion la moins élevée de décès a été

recensée parmi les enfants de moins de 5 ans et chez les aînés. Quoique la grande majorité des victimes de la noyade soient de sexe masculin, la proportion de victimes de sexe féminin a augmenté au cours des dernières années. En 2010, 15 % des victimes de la noyade étaient des femmes, cette proportion s'est accrue un peu plus à chaque année pour atteindre 23 % en 2013, accompagnée d'une hausse du taux de noyade parmi les femmes de 0,4 par 100 000 habitants à 0,6 par 100 000 habitants.

Ethnie

Le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade a commencé à recueillir des données portant sur le pays d'origine des victimes de noyade ainsi que le nombre d'années passées au Canada avant leur noyade dans le but de confirmer les études antérieures qui semblaient indiquer que les nouveaux arrivants au Canada étaient plus susceptibles de se noyer. Il appert malheureusement qu'il soit encore compliqué d'obtenir ces informations, car dans 60 % des cas, le pays d'origine n'a pas pu être déterminé. Cette proportion a toutefois diminué un peu plus à chaque année depuis le début de la collecte de ces données en 2010. En 2013, l'année la plus récente pour laquelle de telles données sont disponibles, le pays d'origine a pu être identifié dans près de la moitié des cas (soit 49 %). Des efforts supplémentaires doivent toutefois être déployés afin d'améliorer la collecte des renseignements pour ce qui est du lieu d'origine des victimes de la noyade. Dans les cas où cette information était disponible, 79 victimes de noyade (depuis 2010) qui ont été rapportés comme ayant comme n'étant pas nés au Canada ou en Amérique du Nord provenaient de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Europe.

Les autochtones continuent d'être le plus à risque de se noyer que les résidents canadiens qui ne sont pas autochtones. Entre 2009 et 2013, une moyenne de 46 victimes de la noyade par année (soit 10 % de toutes les victimes de noyade) étaient d'origine autochtone – une proportion bien plus élevée que les quelque 4 % de la population canadienne s'identifiant comme étant d'origine autochtone.


QUAND LES NOYADES SE PRODUISENT-ELLES?

Mois de l'année

Le temps de l'année où les décès par noyade se produisent au Canada demeure le même d'une année à l'autre. Bien que les décès reliés à l'eau surviennent tout au long de l'année, ils ont principalement lieu lors des mois les plus chauds, principalement au cours de l'été. Entre 2009 et 2013, la majorité des noyades (66 %) ont eu lieu entre mai et septembre et ont atteint un record en juillet et en août (34 %). En 2013, un plus grand nombre de noyade s'est produit au mois de juin (79 soit 17 %) qu'au mois d'août (69 soit 15 %), mais le mois de juillet demeure celui où le plus grand nombre de décès par noyade se produit (81 soit 17 %).

Temps de l'année

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès évitables reliés à l'eau au Canada de 2004 à 2013



Jour de la semaine

Entre 2009 et 2013, plus de la moitié (soit 54 %) des noyades ont eu lieu au cours de la fin de semaine (de vendredi à dimanche) et un peu moins de la moitié (soit 46 %) pendant la semaine (de lundi à jeudi). En comparaison avec les cinq années précédentes, la fréquence et la proportion de noyades en fin de semaine par rapport à celles durant la semaine n'a pas vraiment changé. En 2013, un quart (soit 26 %) de tous les décès liés à l'eau se sont produits le samedi et un autre 20 % le dimanche. Pendant la semaine, les noyades ont eu lieu le plus souvent le lundi (13 %) que le vendredi (11 %).



OÙ LES NOYADES ONT-ELLES LIEU?

Plans d'eau

Comparable aux années antérieures, les plans d'eau naturels, soient les lacs et les étangs (37 %), les rivières et les ruisseaux (28 %) et les océans (9 %) demeurent les lieux où surviennent la majorité (74 %) des noyades au Canada pour la période allant de 2009 à 2013. Uniquement au cours de 2013, 326 personnes se sont noyées dans des plans d'eau naturels. Le taux de noyade dans des plans d'eau naturel varie par contre quelque peu selon le secteur géographique. Ce pourcentage est toutefois beaucoup plus élevé dans les Territoires et les Provinces maritimes où au cours de la période de 2009 à 2013 de 86 à 100 % des décès reliés à l'eau sont survenus dans des plans d'eau naturels.

Les noyades dans des milieux non naturels sont toujours plus communes dans les provinces centrales, soit les Prairies et la Colombie Britannique. Comme auparavant, ce sont les baignoires qui constituent l'environnement non naturel où ont lieu le plus de noyades au Canada (soit 9 %). Le plus grand nombre de noyades dans les baignoires par province s'est produit en Ontario (102), au Québec (37), en Colombie Britannique (26) et en Alberta (21) contribuant ainsi à un pourcentage de 12 %, 9 %, 7 % et 11 % du total des noyades dans ces provinces respectivement. En 2013, un total de 43 Canadiens se sont noyés dans une baignoire.

Les enfants de moins d'un an et les personnes de plus de 65 ans sont notamment plus susceptibles de se noyer dans une baignoire. Les deux tiers de toutes les noyades impliquant des enfants en bas âge ont en effet eu lieu dans une baignoire. Chez les adultes de 65 ans et plus 55 % des décès par noyade sont survenues dans une baignoire.

Un total de 7 % de toutes les noyades au Canada de 2009 à 2013 s'est déroulé dans des piscines, maintenant ainsi une constance avec les années antérieures. La majorité de

ces décès se sont produits dans des piscines résidentielles (soit 86 %) ce qui constitue le principal lieu où les enfants de moins de 5 ans se noient le plus fréquemment (soit 43 %).

Une des dix mesures à prendre dans le but de prévenir les noyades émises dans le Rapport global sur la noyade de l'Organisation mondiale de la santé consiste à installer des barrières contrôlant l'accès à la piscine. Ce rapport confirme l'importance d'installer des clôtures sur les quatre côtés des piscines ainsi que des portes à fermeture automatique et des loquets de sécurité à l'épreuve des enfants. Il est encore difficile d'obtenir des renseignements détaillés


concernant la présence d'une clôture et d'une porte lors d'une noyade dans une piscine résidentielle. Dans les cas où nous avons obtenus ces informations, 38 % des piscines n'avaient pas de clôture ou avaient une clôture non réglementaire et 78 % ne possédaient pas de porte ou celle-ci ne fermait pas automatiquement ou le loquet n'était pas sécuritaire.

Comme à chaque année, les noyades dans les piscines supervisées par des surveillants sauveteurs telles que les piscines publiques et les plages sont toujours aussi rares. Elles constituent moins de 2 % de décès par noyade dans un lieu supervisé par un surveillant sauveteur de 2009 à 2013.



Plans d'eau

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès évitables reliés à l'eau au Canada de 2004 à 2013



Provinces et territoires

De 2009 à 2013, les décès reliés à l'eau ont connu une baisse dans la majorité des provinces et territoires correspondant ainsi à une diminution globale du taux national de noyade par rapport à la période antécédente de cinq ans.

Les plus grandes réductions se sont produites dans les Territoires. Au cours de 2009 à 2013, le taux de noyade dans le Nord du Canada a chuté de 33 % à 9,6 par 100 000 habitants (une baisse de 14,4 par 100 000 habitants en comparaison avec les données de 2004 à 2008). Le changement le plus remarquable a été recensé dans les Territoires du Nord-Ouest (de - 60 % soit de 17,1 à 6,9 par 100 000 habitants), suivi du Nunavut (de - 24 % soit de 16,2 à 12,3 par 100 000 habitants) et du Yukon (de - 13% soit de 11,8 à 10,2 par 100 000 habitants).

Malgré ces diminutions substantielles, le taux de noyade dans les Territoires continue d'être considérablement plus élevé que celui dans l'ensemble du Canada, c'est-à-dire un taux sept fois supérieur à la moyenne.

Les autres provinces ayant connu une baisse de leur taux de décès reliés à l'eau furent l'Île-du-Prince-Édouard (- 63 %), l'Alberta (-19 %), le Nouveau Brunswick (- 17 %), la Nouvelle-Écosse (-12 %), la Colombie Britannique (- 9 %) ainsi que le Québec (- 7 %).


Malgré un déclin global du taux national de noyade, le nombre de décès reliés à l'eau a toutefois augmenté dans quelques provinces. Les taux de noyade ont subi une hausse en Saskatchewan (+ 13 % de 2009 à 2013 en comparaison avec 2004 à 2008), Terre-Neuve et Labrador (+ 12 %) et au Manitoba (+ 9 %).

Milieus urbains versus milieux ruraux

Bien que moins de 20 % de la population canadienne vive en milieu rural, près de 40 % de toutes les noyades s'y sont produites entre 2009 et 2013. La Saskatchewan (82 %), le Manitoba (69 %) et les Territoires (65 %) affichent les plus fortes proportions de noyades en milieu rural au Canada. Quoique le pourcentage de la population de ces régions vivant en milieu rural soit plus élevé que celui des autres provinces, à l'exception du Nunavut, une plus grande portion de leur population vit par contre en milieu urbain et non en milieu rural. Au Canada, entre 2009 et 2013 près de la moitié (soit 49 %) des victimes de noyade en milieu rural auraient résidé de manière permanente en milieu urbain.

Par provinces et territoires

Moyenne du nombre de décès évitables reliés à l'eau par année et taux de décès au Canada de 2004 à 2013



À QUELS TYPES D'ACTIVITÉS LES VICTIMES S'ADONNAIENT-ELLES?

But de l'activité

Entre 2009 et 2013, il n'y a eu aucun changement au fait que c'est encore lors d'activités récréatives qu'a lieu la majorité des noyades au Canada. Les activités récréatives comptent pour près de deux tiers de tous les décès reliés à l'eau (soit 61 %). En moyenne 289 personnes ont été victimes de noyade au Canada annuellement alors qu'elles participaient à des activités de loisir dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau. L'activité récréative la plus couramment pratiquée parmi les victimes de ces noyades sont survenues lors de la pratique de la « natation » (26 %) et de marcher, courir ou jouer près de l'eau ou sur la glace (16 %). Les bateaux à moteur (11 %) et la pêche à bord d'une embarcation (9 %) font également partie des activités récréatives auxquelles les victimes participaient lorsqu'elles se sont noyées. Au cours de 2013, 179 personnes (soit 38 %) sont décédées alors qu'elles s'adonnaient à une de ces quatre activités.


La deuxième activité la plus populaire après les activités récréatives était celle de la vie quotidienne et recense la plus haute proportion d'incidents de noyade au Canada (soit 25 %). Au Canada entre 2009 et 2013, une moyenne de 119 personnes vaquait à une « activité de la vie quotidienne » juste avant de se noyer. Cela représente une légère baisse (- 5 %) par rapport à la période allant de 2004 à 2008. La majorité de ces victimes étaient en train de prendre un bain (33 %) ou ont été impliquées dans un accident de voiture (32 %) lors d'un déplacement. En 2013, 42 personnes se sont noyées en prenant leur bain et 36 sont décédées lorsque leur voiture a percuté un plan d'eau.

Peu de noyades sont survenues pendant une activité professionnelle (6 %) au Canada; une moyenne annuelle de 26 décès par noyades liées à des activités professionnelles a toutefois été recensée entre 2009 et 2013 et ceci constitue une légère hausse (de + 4 %) que la moyenne annuelle de 2004 à 2008. Le secteur d'activité professionnelle le plus vulnérable continue d'être la pêche commerciale (37 % de 2009 à 2013). La conduite d'un véhicule représente une autre activité professionnelle courante dans laquelle les victimes étaient engagées avant de se noyer. En 2013 un plus grand nombre de victimes sont décédées lors de la conduite professionnelle d'un véhicule (soit 32 %) que lors de la pêche commerciale (soit 29 %).

Pour une moyenne annuelle de 29 victimes de la noyade (soit 6 %) l'activité pratiquée immédiatement avant leur noyade est inconnue, ce qui indique que plusieurs de ces victimes pratiquaient des activités aquatiques alors qu'elles étaient seules ou que personne ne peut témoigner au sujet de l'activité pratiquée par les victimes de noyade avant l'incident en question.

Les principales activités récréatives

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès évitables reliés à l'eau au Canada de 2009 à 2013




Type d'activité

L'activité la plus communément pratiquée juste avant les noyades entre 2009 et 2013 demeure la même que lors de la période des cinq années précédentes. La navigation de plaisance (26 %) était encore une fois la plus courante avec une moyenne de 124 personnes qui se sont noyées à chaque année en pratiquant une quelconque activité de plaisance. Entre 2009 et 2013, dans le type d'activité le plus fréquent de nature « aquatique » (25 %), c'est-à-dire que la victime avait l'intention d'être dans l'eau au moment de l'incident nous avons recensé autant de décès que lors d'activités de plaisance. Une moyenne de 120 personnes perde la vie à chaque année lors d'activités aquatiques comme nager et patager.

Après la plaisance et les activités aquatiques, une chute accidentelle dans l'eau lors d'une activité autre qu'aquatique a entraîné le prochain plus grand pourcentage d'incidents (soit 20 %). Une moyenne de 96 personnes se noie annuellement suite à une dégringolade non intentionnelle dans l'eau. Les déplacements terrestres, sur la glace et aériens (15 %) et être dans une baignoire (9 %) comptent pour une moindre portion des décès liés à l'eau – une moyenne de 73 personnes décèdent par noyade à chaque année dans des incidents lors de déplacement et 40 autres personnes quant à elles se sont noyées dans leur baignoire.


But de l'activité

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès évitables liés à l'eau au Canada de 2004 à 2013




Type d'activité

Moyenne du nombre de décès par années et pourcentage de décès évitables liés à l'eau au Canada de 2004 à 2013



Incidents en navigation de plaisance par genre d'embarcation

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès liés à la navigation de plaisance au Canada de 2004 à 2013



Navigation de plaisance

Les caractéristiques des décès associés à la navigation de plaisance au Canada sont semblables à celles enregistrées au cours des périodes antérieures. Plus de la moitié (soit 54 %) de ces décès ont encore une fois eu lieu lors de l'utilisation d'un bateau à moteur. Les petits bateaux à moteur de moins de 5,5 mètres de long ont davantage été impliqués dans de tels incidents (26 %) que les grands bateaux à moteur (13 %) et les motomarines (2 %). Les canots constituent le deuxième type d'embarcation le plus souvent impliqués lors d'incidents liés à la navigation de plaisance (21 %).

Dans le cas des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels l'information au sujet des vêtements de flottaison individuels (VFI) était disponible, 82 % des victimes ne portaient pas de VFI/gilet de sauvetage au moment de l'incident. Parmi les victimes qui ne portaient pas de VFI/gilet de sauvetage (soit 443), au moins 150 (soit 34 %) d'entre elles en avaient un à bord de l'embarcation, mais ne le portaient pas au moment de l'incident. La consommation d'alcool est un facteur lié à 39 % des décès associés à la navigation de plaisance. Le type le plus commun d'incidents reliés à la plaisance résultant en une noyade étaient le chavirement (38 %) et tomber ou être projeté hors de l'embarcation (28 %).

POURQUOI LES NOYADES SE SONT-ELLES PRODUITES? LES FACTEURS DE RISQUE...

Les principaux facteurs de risque des décès reliés à l'eau au Canada contribuant au « pourquoi » ils se sont produits reflètent ceux déjà identifiés par la Société de sauvetage dans le passé. La consommation d'alcool est un facteur courant associée à la noyade; au Canada, dans environ un cas de décès par noyade sur trois, la victime avait consommé de l'alcool avant l'incident. L'absence du port d'un vêtement de flottaison individuel ou d'un gilet de sauvetage à bord d'une embarcation est également une circonstance courante, car d'après nos statistiques seulement 1 victime sur 10 des décès par noyade portait un VFI au moment de l'incident. La consommation d'alcool ainsi que ne pas porter un VFI sont des facteurs de risque plus particulièrement chez les ados (de 15 à 19 ans) et les jeunes adultes (de 20 à 34 ans).

Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux facteurs de risque établis de 2009 à 2013. Ces facteurs sont présentés d'après les activités les plus courantes (soit la natation et la plaisance) ainsi que par groupes d'âge.



Navigation de plaisance

- Absence du port de VFI/gilet de sauvetage (82 % des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Eau froide (59 % des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels l'information au sujet de la température de l'eau était disponible)
- Consommation d'alcool (39 %)
- Chavirement (38 %)
- Navigation non accompagné (30 %)
- Chute dans l'eau ou projection par-dessus bord (28 %)
- Plaisance dans l'obscurité ou à la tombée de la nuit (24 %)
- Eau agitée (20 %)

Natation

- Ne pas savoir nager ou ne pas bien savoir nager (45 % des décès associés à la pratique de la natation pour lesquels l'information au sujet des habiletés en natation était disponible)
- Consommer de l'alcool (33 %)
- Nager seul (26 %)
- Être victime d'un malaise/accident cardiaque soudain pendant la pratique de la natation (20 %)

De 0 à 4 ans

- Être seul près de l'eau (60 %)
- Ne pas être supervisé (53 %)
- Être supervisé de manière distraite (40 %)
- Être uniquement en présence d'autres mineurs (20 %)

De 5 à 14 ans

- Ne pas porter de VFI lorsque requis (55 %)
- Être uniquement en présence d'autres mineurs (49 %)

De 15 à 19 ans

- Ne pas porter de VFI lorsque requis (92 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Consommer de l'alcool (44 %)
- Ne pas être accompagné (28 %)
- Être dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau la nuit tombée (24 %)

De 20 à 34 ans

- Ne pas porter de VFI lorsque requis (86 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Consommer de l'alcool (51 %)
- Ne pas être accompagné (30 %)
- Être dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau la nuit tombée (26 %)

De 35 à 64 ans

- Ne pas porter de VFI lorsque requis (78 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Ne pas être accompagné (50 %)
- Consommer de l'alcool (38 %)

65 ans et plus

- Ne pas porter de VFI lorsque requis (82 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Ne pas être accompagné (71 %)
- Consommer de l'alcool (22 %)

RAPPORT SUR LA NOYADE AU CANADA ÉDITION DE 2016

En bref

D'après les dernières données en provenance des bureaux des coroners, la tendance à la baisse du nombre de décès par noyade se poursuit au Canada. En 2013, le nombre de décès évitables reliés à l'eau a connu une diminution pour totaliser 466.

C'est encore parmi les hommes, les jeunes adultes de 20 à 34 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans que l'on déplore le plus grand nombre de noyades.

Les noyades sont plus susceptibles de se produire durant l'été et lors des fins de semaine et ce dans des plans d'eau naturels tels que les lacs et les rivières. Il y a moins de noyades dans les piscines résidentielles, mais celles-ci représentent toujours un risque en particulier pour les enfants de moins de cinq ans.

Malgré une diminution substantielle en comparaison avec les cinq années antérieures, le plus haut taux de noyades en 2013 a encore une fois été recensé dans les Territoires. Le taux d'incidents reliés à l'eau a augmenté en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Manitoba.

Pour ce qui est du but de l'activité, le plus grand pourcentage d'incidents s'est produit lors d'activités en navigation de plaisance. Les plus communes étaient la natation et marcher, courir ou jouer près de l'eau. Par type d'activité, la plaisance et les activités récréatives étaient les plus courantes.

Les progrès réalisés à long terme dans le but de faire diminuer le nombre de noyades au Canada sont encourageants, mais il se produit annuellement encore près de 500 décès évitables et non intentionnels reliés à l'eau. Ce fait confirme le besoin pour nous de poursuivre nos efforts de prévention de la noyade.

Méthodologie de recherche

Les données complètes de 1990 à 2013

Le processus de recherche sur la noyade repose sur une collecte de données, des tableaux de recherche et une analyse de ceux-ci. Les données sur la noyade proviennent des bureaux des coroners en chef et des médecins légistes de chaque province et territoire. L'ampleur de cette recherche comprend ce qui suit :

- La collecte des données requises afin d'établir le profil des victimes d'incidents reliés à l'eau, incluant les circonstances et les facteurs ayant contribué à ces incidents.
- Inclut l'ensemble des décès déplorés dans chaque province et territoire ainsi que globalement au Canada résultant d'incidents ayant eu lieu « dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau ». Ces incidents sont inclus s'ils sont étroitement liés à des activités aquatiques récréatives, professionnelles ou de vie quotidienne ou si la présence de l'eau semble avoir été un attrait ayant contribué à l'incident.
- Inclus seulement les décès non intentionnels. N'inclus pas ceux résultant de causes naturelles, les suicides ou les homicides.

Les données provisoires

Les données finales complètes sur les plus récentes noyades et autres décès liés au domaine aquatique en provenance de bureaux provinciaux et territoriaux des coroners en chef et des médecins légistes ne sont pas encore disponibles. Ces données provisoires et préliminaires proviennent par conséquent de communiqués de presse, d'extraits d'articles parus dans des journaux, de rapports de nouvelles et de recherches sur Internet.

Remerciements

Nous tenons à souligner notre gratitude pour l'appui, la collaboration et les efforts des personnes suivantes :

- Les bureaux des Coroners en chef et des Médecins légistes en chef de chaque province et territoire qui nous ont permis et ont favorisé l'accès aux rapports confidentiels sur les décès évitables associés à l'eau. Ces données ont fournies la base pour ce qui est de la recherche et pour l'élaboration de ce rapport.
- Nos bénévoles, qui ont consacré leur temps et leur énergie à effectuer des recherches, soit l'extraction des données sur les décès évitables reliés à l'eau à partir des rapports des coroners.
- Tessa Clemens qui a assumé les rôles d'auteure principale et d'analyste de données pour l'élaboration de ce rapport et Lucie Simoes, qui s'est chargée de la saisie et de la vérification de ces données.

Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade

Le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade est la principale agence de recherche sur la noyade et les incidents liés à l'eau au Canada. Le Centre effectue des recherches sur les noyades fatales et non fatales, les traumatismes aquatiques majeurs et les interventions de sauvetage.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez communiquer avec Barbara Byers, Directrice de la recherche par courriel à : experts@drowningresearch.ca ou par téléphone au 416-490-8844.

Coordonnées pour nous rejoindre

Bureau national

Téléphone : 613.746.5694
Courriel : experts@sauvetage.ca
www.sauvetage.ca

Colombie-Britannique et Yukon

Téléphone : 604.299.5450
Courriel : info@lifesaving.bc.ca
www.lifesaving.bc.ca

Alberta et Territoires du Nord-Ouest

Téléphone : 780.415.1755
Courriel : experts@lifesaving.org
www.lifesaving.org

Saskatchewan

Téléphone : 306.780.9255
Courriel : lifesaving@sasktel.net
www.lifesavingsociety.sk.ca

Manitoba

Téléphone : 204.956.2124
Courriel : aquatics@lifesaving.mb.ca
www.lifesaving.mb.ca

Ontario

Téléphone : 416.490.8844
Courriel : experts@lifeguarding.com
www.lifesavingsociety.com

Québec

Téléphone : 514.252.3100 ou
1.800.265.3093
Courriel : alerte@sauvetage.qc.ca
www.sauvetage.qc.ca

Nouveau-Brunswick

Téléphone : 506.455.5762
Courriel : info@lifesavingnb.ca
www.lifesavingnb.ca

Nouvelle-Écosse

Téléphone : 902.425.5450
Courriel : experts@lifesavingsociety.ns.ca
www.lifesavingsociety.ns.ca

Île-du-Prince-Édouard

Téléphone : 902.368.7757
Courriel : info@lifesavingsocietypei.ca
www.lifesavingpei.ca

Terre-Neuve-et-Labrador

Téléphone : 709.576.1953
Courriel : ed@lifesavingnl.ca
www.lifesavingnl.ca

La Société de sauvetage

La Société de sauvetage – l'expert en surveillance aquatique au Canada – se consacre à la prévention de la noyade et des traumatismes associés à l'eau par le biais de ses programmes de formation, sa campagne d'éducation du public Aqua Bon^{MD}, ses services de gestion en sécurité aquatique, sa recherche sur la noyade et le sauvetage sportif. Plus de 1 000 000 de Canadiens participent annuellement aux cours de formation de la Société en natation, sauvetage, surveillance aquatique et leadership. La Société établit les normes pour ce qui est de la sécurité aquatique au Canada et elle décerne les certificats à tous les surveillants-sauveteurs au Canada.



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique